

Andrea Aglić-Aljinović

Neven Elezović

1.

Vektori


1. Operacije s vektorima	2
2. Koordinatni sustavi i kanonska baza	8
3. Skalarni umnožak	13
4. Vektorski umnožak	17
5. Mješoviti umnožak	20
6. Rastav vektora po bazi	22
7. Dvostruki umnožak	24
8. Dodatak	26
9. Riješeni zadaci	27
10. Zadaci za vježbu	33

1.1. Operacije s vektorima

U fizikalnom svijetu lako ćemo prepoznati mnoge veličine čija se vrijednost izražava brojem. To su na primjer duljina, površina, obujam, temperatura, tlak, masa, kinetička energija, specifična gustoća... Nazivamo ih **skalarnim** veličinama. Međutim, neke se veličine ne mogu opisati samo brojem. Tako vjetar opisujemo njegovom jačinom, ali i *smjerom*. *Brzina* je fizikalna veličina koja uz svoj iznos mora imati definiran i smjer. Isto će vrijediti i za ubrzanje, silu, moment sile, iznos električnog ili magnetskog polja itd.

Definicija vektora

Usmjerena dužina \vec{AB} je dužina za koju se zna **početna** točka A i **završna** točka B . Dvije usmjerene dužine \vec{AB} i \vec{CD} su ekvivalentne ako postoji translacija koja prevodi jednu u drugu, tj. ako je četverokut $ABDC$ paralelogram. Tada pišemo $\vec{AB} = \vec{CD}$. Sve međusobno ekvivalentne dužine nazivamo **vektorom**¹. Pojedinu dužinu iz te klase nazivamo **reprezentantom (predstavnikom)** vektora.



Sl. 1.1. Vektor je klasa usmjerenih dužina. Dvije usmjerene dužine koje se translacijom dovođe jedna na drugu definiraju isti vektor.

Zapis vektora. Vektor se najčešće označava slovom iznad kojeg je postavljena strelica: \vec{a} . U novije doba je, pogotovo u knjigama, uobičajeno vektore pisati masnim slovima, ovakvo: **a**, **b**, **x** i slično, pa ćemo se takvim zapisom i mi koristiti.

Po dogovoru, pisat ćemo i $\mathbf{a} = \vec{AB}$, poistovjećujući vektor s nekim njegovim reprezentantom. Vektor ne ovisi o izboru reprezentanta. Dvije ekvivalentne usmjerene dužine predstavljaju isti vektor.

Opis vektora

Vektor u ravnini ili prostoru opisan je ako se znaju sljedeća tri podatka:

- **nosač:** pravac na kojemu se vektor nalazi
- **orientacija** na tom pravcu
- **duljina vektora** $|\vec{AB}|$, koja se definira kao udaljenost $d(A, B)$ točaka A i B .

¹ engl. *vector*, njem. *Vektor*, fran. *vecteur*, rus. *вектор* od lat. *vector* – nositelj.

Prema tome, usmjerene dužine koje leže na paralelnim (moguće istovjetnim) pravcima, imaju istu orientaciju i jednaku duljinu definiraju isti vektor.

Ponekad je pogodnije govoriti o **smjeru** vektora. Smjer objedinjuje pojmove nosača i orientacije. Tako kažemo da je vektor određen smjerom i iznosom.

Nul-vektor. Nul-vektor se definira kao vektor duljine 0. Označavamo ga sa **0**. Tako je $\mathbf{0} = \overrightarrow{AA}$, za bilo koju točku A . Jedino kod nul-vektora nema smisla govoriti niti o nosaču, niti o smjeru.

Radius-vektor. Skup svih vektora označavat ćemo slovom V . Bude li potrebno pojasniti, V^2 će predstavljati sve vektore ravnine, a V^3 vektore u prostoru.


Istaknimo jednu točku u prostoru i označimo je slovom O . Moguće je za svaki vektor izabrati njegova reprezentanta tako da mu početna točka bude baš ta točka O .

Vektor \overrightarrow{OT} nazvat ćemo tada **radius-vektor** točke T u prostoru.

Zbrajanje vektora

Neka su \mathbf{a} , \mathbf{b} bilo kakvi vektori, \overrightarrow{AB} bilo koji predstavnik vektora \mathbf{a} te \overrightarrow{BC} predstavnik vektora \mathbf{b} s početkom u točki B . Zbroj vektora $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ određen je predstavnikom \overrightarrow{AC} . Dakle,

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}. \quad (1)$$




Sl. 1.2. Zbrajanje dvaju vektora. Vektore zbrajamo tako da početak drugog izaberemo u završnoj točki prvog vektora.

Ova operacija ima svojstva

- | | |
|--------|--|
| VP_1 | $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \mathbf{c} = \mathbf{a} + (\mathbf{b} + \mathbf{c})$ |
| VP_2 | $\mathbf{a} + \mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{a} = \mathbf{a}$ |
| VP_3 | $(\forall \mathbf{a} \in V)(\exists \mathbf{a}' \in V) \mathbf{a} + \mathbf{a}' = \mathbf{a}' + \mathbf{a} = \mathbf{0}$ |
| VP_4 | $\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{b} + \mathbf{a}$ |

Svojstvo VP_1 kaže da je zbrajanje **asocijativno**: nebitno je kojim se redom zbrajaju tri vektora. Dakako da identičan zaključak (koristeći se principom indukcije) vrijedi i za zbroj više od triju vektora (sl. 1.3.). Svojstvo VP_2 ukazuje da je nul-vektor **0 neutralni element** za zbrajanje vektora. VP_3 kaže da za svaki vektor iz V možemo pronaći njemu suprotan vektor \mathbf{a}' , koji u zbroju sa \mathbf{a} daje nul-vektor. Zaista, ako je \mathbf{a} prikazan usmjerrenom dužinom \overrightarrow{AB} , tada je njemu suprotan definiran sa $\mathbf{a}' = \overrightarrow{BA}$, jer je po definiciji zbrajanja $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \mathbf{0}$. Suprotan vektor označavamo još i na način $\mathbf{a}' = -\mathbf{a}$. Svojstvo VP_4 pokazuje da je zbrajanje vektora **komutativno**: svejedno je zbrajamo li prvi vektor s drugim ili drugi s prvim. Na tom se svojstvu zasniva definicija zbrajanja s pomoću pravila paralelograma. Vidi sl. 1.3.




Sl. 1.3. Zbrajanje vektora je komutativno (lijevo). Stoga se dva vektora mogu zbrajati (ako im je hvatište zajedničko) s pomoću pravila paralelograma. Način zbrajanja više od dvaju vektora, nadovezivanjem (u sredini): vektore nanižemo tako da je početak narednoga u završetku prethodnoga. Zbroju odgovara vektor koji ima početak u početku prvoga, a završetak u završetku posljednjega. Zbrajanje vektora je asocijativno (desno). Ovo svojstvo opravdava prethodno pravilo zbrajanja.

Oduzimanje vektora. Oduzimanje vektora definira se kao operacija zbrajanja sa suprotnim vektorom:

$$\mathbf{a} - \mathbf{b} = \mathbf{a} + (-\mathbf{b}).$$

Grafički vektore najlakše oduzimamo tako da im izaberemo reprezentante sa zajedničkim hvatištem. Tad vrijedi

$$\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}.$$




Sl. 1.4. Dva se vektora oduzimaju tako da se dovedu u zajedničko hvatište. Razlici odgovara vektor čije je hvatište u završetku drugog, a završetak u završetku prvog vektora.

Množenje vektora skalarom

To je operacija $\cdot : \mathbb{R} \times V \rightarrow V$ definirana na način: za realni broj λ vektor $\lambda \mathbf{a}$ ima

- nosač identičan nosaču od \mathbf{a}
- orientaciju istu, ako je $\lambda > 0$, suprotnu za $\lambda < 0$
- duljinu $|\lambda \mathbf{a}| = |\lambda| |\mathbf{a}|$.




Sl. 1.5. Množenje vektora skalarom

U zapisu množenja vektora skalarom obično izostavljamo znak \cdot , te pišemo kratko $\lambda \mathbf{a}$, $2AB$ i slično.

To množenje ima sljedeća svojstva

$$\begin{array}{ll} VP_5 & \lambda(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \lambda\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b}, \\ VP_6 & (\lambda + \mu)\mathbf{a} = \lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{a}, \\ VP_7 & (\lambda\mu)\mathbf{a} = \lambda(\mu\mathbf{a}). \end{array}$$

Sl. 1.6. Ova slika opravdava svojstvo VP_5 . Nacrtaj odgovarajuće skice za svojstva VP_6 i VP_7 .



Istaknimo (zbog potpunosti ovog popisa) i sljedeće očito svojstvo:

$$VP_8 \quad 1 \cdot \mathbf{a} = \mathbf{a}.$$

Primijetimo da je $(-1) \cdot \mathbf{a} = -\mathbf{a}$ (suprotan vektor). Posebno definiramo množenje s nul-vektorom: $\lambda \cdot \mathbf{0} := \mathbf{0}$.

Jedinični vektor. Neka je $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ zadani vektor. Sa $\hat{\mathbf{a}}$ označavamo **jedinični vektor** vektora \mathbf{a} . To je vektor koji ima isti smjer kao i \mathbf{a} , a duljina mu je 1. Dobijemo ga tako da vektor podijelimo s njegovom duljinom:

$$\hat{\mathbf{a}} = \frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|}.$$

V³ je vektorski prostor

Svaki skup na kojemu su definirane dvije operacije: zbrajanje vektora i množenje vektora skalarom, tako da su zadovoljena svojstva $VP_1 - VP_8$, naziva se **vektorski prostor**. Ovim smo provjerili da V^3 smijemo nazivati *vektorski prostor*. Jednako tako su vektorski prostori i skupovi V^1 vektora na pravcu i V^2 vektora u ravnini.

Prisjetimo se definicije linearne nezavisnosti.

Linearna nezavisnost vektora

Vektori $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ su linearno nezavisni ako iz jednakosti

$$\lambda_1\mathbf{a}_1 + \lambda_2\mathbf{a}_2 + \dots + \lambda_n\mathbf{a}_n = \mathbf{0}$$

nužno slijedi $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$.

Najvažniju informaciju o nekom vektorskem prostoru daje nam pojam **dimenzije** tog prostora.

Dimenzija i baza prostora

Najveći broj linearne nezavisnih vektora u nekom vektorskom prostoru zovemo **dimenzijom** tog prostora.

Ako je n dimenzija prostora V , tada svaki skup $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ od n linearne nezavisnih vektora nazivamo **bazom** vektorskog prostora.

Ova su dva pojma isprepletena: ako znamo dimenziju, znamo *koliko* linearne nezavisnih vektora sadrži baza i obrnuto. Taj je broj jednoznačno određen, tj. ne ovisi o mogućem izboru različitih baza, što ovdje nećemo dokazivati.

Primjer 1. Prostor V^1 vektora na pravcu dobiven je tako da se za vektor $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ promotre svi vektori oblika

$$\{\lambda \mathbf{a} : \lambda \in \mathbb{R}\}.$$

Vidimo da je $V^1 = L(\mathbf{a})$. Svaka dva vektora iz V^1 su linearne zavisne: jedan je višekratnik drugoga. Zato je najveći broj nezavisnih vektora u prostoru V^1 jednak 1; i to je upravo dimenzija prostora V^1 . Svaki ne nul-vektor čini bazu tog prostora.

Primjer 2. Sa V^2 označavamo dvodimenzionalni vektorski prostor: to je prostor u kojem su najviše dva vektora linearne nezavisna.

Neka su \mathbf{a}_1 i \mathbf{a}_2 bilo koja dva nekolinearna vektora. Tad su oni linearne nezavisni i svaki treći vektor prostora V^2 može se izraziti u obliku linearne kombinacije vektora \mathbf{a}_1 i \mathbf{a}_2 . Zato je

$$V^2 = L(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2) = \{\mathbf{a} = \lambda_1 \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \mathbf{a}_2 : \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}\}.$$

Vektori \mathbf{a}_1 i \mathbf{a}_2 čine bazu.

Primijeti da bazu ovoga prostora čine i bilo koja druga dva linearne nezavisna vektora.

Ako vektor \mathbf{a} napišemo preko linearne kombinacije vektora \mathbf{a}_1 i \mathbf{a}_2 , tad kažemo da smo vektor \mathbf{a} *rastavili u komponente* po vektorima \mathbf{a}_1 i \mathbf{a}_2 .

Iskažimo sad u obliku teorema jednu jednostavnu ali važnu tvrdnju koju zadovoljavaju vektori prostora V^2 . Student će primijetiti da će analogne tvrdnje vrijediti i za bilo koji vektorski prostor.

Teorem 1. Neka su \mathbf{a}_1 i \mathbf{a}_2 linearne nezavisni. Prikaz vektora $\mathbf{a} \in V^2$ u obliku

$$\mathbf{a} = \lambda_1 \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \mathbf{a}_2 \tag{2}$$

je jednoznačan, tj. skalari λ_1 i λ_2 su jednoznačno određeni.


Dokaz. Pretpostavimo da se \mathbf{a} može napisati u obliku (2) na dva načina:

$$\mathbf{a} = \lambda_1 \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \mathbf{a}_2 = \mu_1 \mathbf{a}_1 + \mu_2 \mathbf{a}_2.$$

Odavde bi slijedilo

$$(\lambda_1 - \mu_1) \mathbf{a}_1 + (\lambda_2 - \mu_2) \mathbf{a}_2 = \mathbf{0}.$$

Budući da su $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ linearne nezavisni, zaključujemo da mora vrijediti $\lambda_1 = \mu_1$ i $\lambda_2 = \mu_2$.



Sl. 1.7. Rastavljanje vektora $\mathbf{a} \in V^2$ po komponentama $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ geometrijski se realizira projiciranjem vektora \mathbf{a} na vektore \mathbf{a}_1 i \mathbf{a}_2 . Takav je rastav jedinstven. Što ako vektor $\mathbf{a} \in V^3$ želimo rastaviti po komponentama $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$? Kako se tad može realizirati taj rastav? Mora li on biti jedinstven?

Primjer 3. Prostor V^3 trodimenzionalni je prostor. Njegovu bazu čine bilo koja tri nekomplanarna vektora. Svaki drugi vektor može se prikazati u obliku njihove linearne kombinacije. Zato je


$$V^3 = L(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3) = \{\mathbf{a} = \lambda_1 \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \mathbf{a}_2 + \lambda_3 \mathbf{a}_3 : \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}\}$$

Kažemo još da se svaki vektor \mathbf{a} može rastaviti u komponente u smjerovima vektora $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$. Taj je rastav jedinstven!

Primjer 4. Točka C dijeli dužinu AB u omjeru $\lambda : 1$,

- $d(A, C) : d(C, B) = \lambda : 1$.

Prikažimo vektor \overrightarrow{OC} kao linearnu kombinaciju vektora \overrightarrow{OA} i \overrightarrow{OB} .



Sl. 1.8. Radijus-vektor točke koja dijeli dužinu u zadanom omjeru.

Rješenje. Vrijedi $|\overrightarrow{AC}| = \lambda |\overrightarrow{CB}|$ i zato $\overrightarrow{AC} = \lambda \overrightarrow{CB}$ jer ovi vektori imaju isti nosač i orijentaciju. Zato je

$$\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OA} + \lambda \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{OA} + \lambda (\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC})$$

i odavde

$$\overrightarrow{OC} = \frac{1}{\lambda + 1} \overrightarrow{OA} + \frac{\lambda}{\lambda + 1} \overrightarrow{OB}.$$

Označimo $t = 1/(\lambda + 1)$. Vidimo da se radijus-vektor svake točke T koja leži na dužini AB može prikazati u obliku

$$\overrightarrow{OT} = t \overrightarrow{OA} + (1 - t) \overrightarrow{OB}$$

gdje je t skalar, $0 \leq t \leq 1$.

Specijalno, ako je točka C polovište dužine AB , tada vrijedi

$$\overrightarrow{OC} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}).$$

Primjer 5. Neka je T po volji odabrana točka unutar trokuta ABC . Pokažimo da postoje tri skalara $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, $0 < \lambda_i < 1$, takva da je $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1$ i

$$\overrightarrow{OT} = \lambda_1 \overrightarrow{OA} + \lambda_2 \overrightarrow{OB} + \lambda_3 \overrightarrow{OC}.$$

Rješenje. Neka je D presječna točka pravca kroz A i T sa stranicom \overline{BC} . Prema Primjeru 4, radijus-vektor \overrightarrow{OT} točke T možemo napisati u obliku

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OT} &= t\overrightarrow{OA} + (1-t)\overrightarrow{OD} \\ &= t\overrightarrow{OA} + (1-t)(s\overrightarrow{OB} + (1-s)\overrightarrow{OC}) \\ &= t\overrightarrow{OA} + (1-t)s\overrightarrow{OB} + (1-t)(1-s)\overrightarrow{OC}.\end{aligned}$$


Stavimo

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= t, \\ \lambda_2 &= (1-t)s, \\ \lambda_3 &= (1-t)(1-s).\end{aligned}$$

Tada vrijedi $0 < \lambda_i < 1$

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = t + (1-t)s + (1-t)(1-s) = 1$$

što dokazuje tvrdnju.



Sl. 1.9. Radijus-vektor točke T unutar trokuta je konveksna kombinacija radijus-vektora njegovih vrhova.

1.2. Koordinatni sustavi i kanonska baza

Koordinatni sustav u ravnini. Neka su \mathbf{a}_1 i \mathbf{a}_2 dva nekolinearna vektora u ravnini sa zajedničkim hvatištem u točki O . Točku O nazvat ćemo ishodištem koordinatnog sustava. Trojku $(O, \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2)$ nazivamo **koordinatni sustav** u ravnini. Vektori \mathbf{a}_1 i \mathbf{a}_2 određuju dvije **koordinatne osi**: pravce koji prolaze ishodištem i nosači su vektora \mathbf{a}_1 i \mathbf{a}_2 (sl. 1.10.).


Svakoj točki T u toj ravnini jednoznačno odgovara radijus-vektor \overrightarrow{OT} . Njega pak možemo rastaviti po bazi $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ i vrijedi

$$\overrightarrow{OT} = x_1 \mathbf{a}_1 + x_2 \mathbf{a}_2.$$

Time je položaj točke T opisan parom skalara (x_1, x_2) . Nazivamo ih **koordinate** točke T u sustavu $(O, \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2)$.

Geometrijski, koordinate točke T određuju se njezinim *projiciranjem* na koordinatne osi. Projekcija se vrši u smjeru druge koordinatne osi.

Sl. 1.10. Koordinatni sustav ne mora nužno biti pravokutan: svaka dva nekolinearna (čitaj: linearno nezavisna!) vektora određuju svoj koordinatni sustav. Koordinate točke jednake su komponentama radius-vektora \vec{OT} .



Koordinatni sustav u prostoru. Neka je O istaknuta točka u prostoru. Analogno gornjem, svaka tri nekomplanarna (=linearno nezavisna!) vektora $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ određuju koordinatni sustav $(O; \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3)$.

Za zadanu točku T nije jednostavno odrediti njezine koordinate: potrebno je rastaviti vektor \vec{OT} u linearan spoj vektora $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ i \mathbf{a}_3 .



Izbor baze omogućava nam da operacije s vektorima prevedemo na operacije s njihovim koordinatama u toj odabranoj bazi. Prisjetimo se već dokazanih svojstava:

- svaki je vektor linearna kombinacija vektora neke baze
- taj je prikaz jednoznačan.

Neka je $(O; \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3)$ zadani koordinatni sustav. Trojka $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ čini bazu prostora V^3 . Prikaz bilo kojeg vektora \mathbf{a} u toj bazi je jednoznačan. To znači da postoe jednoznačno određeni skaliari x_1, x_2, x_3 takvi da vrijedi

$$\mathbf{a} = x_1 \mathbf{a}_1 + x_2 \mathbf{a}_2 + x_3 \mathbf{a}_3.$$

Tako vektoru \mathbf{a} možemo pridružiti uredenu trojku (x_1, x_2, x_3) , odnosno, možemo pisati

$$\mathbf{a} \mapsto \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}.$$

Time je vektoru $\mathbf{a} \in V^3$ pridružen vektor-stupac prostora \mathbf{R}^3 .

Ovo pridruživanje čuva vektorske operacije. Zbroju vektora iz V^3 odgovarati će zbroj vektor-stupaca u \mathbf{R}^3 . Isto vrijedi i za umnožak skalara i vektora.

Matematičkim rječnikom kazano, prostori V^3 i \mathbf{R}^3 su **izomorfni**. Izomorfni prostori nisu identični — oni sadrže različite objekte. Međutim, njihova su svojstva i ponašanje identični pa ih možemo u mnogim slučajevima poistovjetiti.

Primijetimo još da ovo pridruživanje *ovisi o izabranoj bazi*. Jedan te isti vektor u različitim bazama ima različite komponente, zato će mu odgovarati različiti vektor-stupci prostora \mathbf{R}^3 .


U svakom konkretnom fizikalnom problemu korisno je odabrati bazu u kojoj ćemo prikazivati vektore jer se time račun s vektorima svodi na račun s njemu pridruženim koordinatama u prostoru \mathbf{R}^3 . Koja je baza pri tom najprikladnija? Izbor baze najčešće ovisi o karakteru problema koji pokusavamo predočiti. Međutim, u najvećem je broju slučajeva najprikladnija tzv. **kanonska baza** i odgovarajući Kartezijev koordinatni sustav koji ćemo sad opisati.

Kanonska baza

Među svim mogućim bazama prostora V^3 izdvojiti ćemo jednu naročito podesnu za prikazivanje vektora.

Kartezijev pravokutni koordinatni sustav čine tri međusobno okomite osi:

- Ox – os **apscisa**
- Oy – os **ordinata**
- Oz – os **aplikata**.



Sl. 1.17. Točkama E_1 , E_2 , E_3 na koordinatnim osima odgovaraju jedinični vektori \mathbf{i} , \mathbf{j} , \mathbf{k} . Koordinate (x, y, z) točke T jednake su komponentama vektora \vec{OT} u rastavu po bazi \mathbf{i} , \mathbf{j} , \mathbf{k} . Taj se rastav određuje okomitim projiciranjem na koordinatne osi.

Zajednička točka O ovih osi je **ishodište** koordinatnog sustava. Izdvojimo točku na jediničnoj udaljenosti od ishodišta na svakoj od ove tri osi i pridružimo joj odgovarajući radijus-vektor.

- Točki $E_1 = (1, 0, 0)$ odgovara radijus-vektor $\mathbf{i} = \vec{OE}_1$.
- Točki $E_2 = (0, 1, 0)$ odgovara radijus-vektor $\mathbf{j} = \vec{OE}_2$.
- Točki $E_3 = (0, 0, 1)$ odgovara radijus-vektor $\mathbf{k} = \vec{OE}_3$.

Po ovoj konstrukciji, Kartezijev sustav je zapravo sustav $(O; \mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k})$ određen točkom O i trima vektorima $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$. Trojku vektora $(\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k})$ nazivamo **kanonska baza** prostora V^3 .



Kako izgleda rastav nekog vektora u toj bazi? Krenimo s radijus-vektorom bilo koje točke $T(x, y, z)$. Za njega očevidno vrijedi

$$\vec{OT} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}.$$

Prema tome, koordinate točke T određuju komponente vektora \vec{OT} u rastavu po kanonskoj bazi.

Neka je sad \mathbf{a} zadani vektor. Njega također možemo napisati kao linearnu kombinaciju vektora kanonske baze. Pritom obično koristimo zapis:

$$\mathbf{a} = a_x\mathbf{i} + a_y\mathbf{j} + a_z\mathbf{k}.$$

Kako se računaju koeficijenti a_x, a_y, a_z ? Neka su $A(x_1, y_1, z_1)$ i $B(x_2, y_2, z_2)$ koordinate njegove početne i završne točke. Taj se vektor može napisati preko radijus-vektora tih točaka na način

$$\begin{aligned}\mathbf{a} &= \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} \\ &= (x_2\mathbf{i} + y_2\mathbf{j} + z_2\mathbf{k}) - (x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j} + z_1\mathbf{k}) \\ &= (x_2 - x_1)\mathbf{i} + (y_2 - y_1)\mathbf{j} + (z_2 - z_1)\mathbf{k}\end{aligned}$$

Prema tome, vrijedi

$$a_x = x_2 - x_1, \quad a_y = y_2 - y_1, \quad a_z = z_2 - z_1.$$

Primjer 6. U pravokutniku $OABC$ s vrhovima $O(0, 0)$, $A(3, 0)$, $C(0, 4)$ povučene su spojnice OM , ON vrha O s polovištima M i N stranica \overline{AB} , \overline{BC} . Rastavimo vektor \overrightarrow{OB} po komponentama u smjerovima vektora \overrightarrow{OM} i \overrightarrow{ON} .

Rješenje. Zbog komplanarnosti vektora \overrightarrow{OM} , \overrightarrow{OB} , \overrightarrow{ON} , postoežtaklari t i s takvi da je

$$\overrightarrow{OB} = t\overrightarrow{OM} + s\overrightarrow{ON}.$$

Odredimo ih. Vrijedi

$$\overrightarrow{OB} = 3\mathbf{i} + 4\mathbf{j},$$


$$\overrightarrow{OM} = 3\mathbf{i} + 2\mathbf{j},$$

$$\overrightarrow{ON} = \frac{3}{2}\mathbf{i} + 4\mathbf{j}$$

i mora vrijediti

$$3\mathbf{i} + 4\mathbf{j} = t(3\mathbf{i} + 2\mathbf{j}) + s\left(\frac{3}{2}\mathbf{i} + 4\mathbf{j}\right).$$

Dakle, $3 = 3t + \frac{3}{2}s$ i $4 = 2t + 4s$. Odavde je $t = s = \frac{2}{3}$. Prema tome traženi rastav je $\overrightarrow{OB} = \frac{2}{3}\overrightarrow{OM} + \frac{2}{3}\overrightarrow{ON}$.



Sl. 1.12.

Primjer 7. Zadani su vrhovi $A(1, -2, 3)$, $B(3, 2, 1)$, $C(6, 4, 4)$ paralelograma $ABCD$. Odredimo koordinate vrha D .

Rješenje. Da bismo našli koordinate vrha D , trebamo naći radijus-vektor \overrightarrow{OD} . Vrijedi

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OD} &= \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OA} \\ &= (6\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 4\mathbf{k}) - (3\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + \mathbf{k}) + (\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}) = 4\mathbf{i} + 6\mathbf{k}.\end{aligned}$$

Dakle, $D(4, 0, 6)$.

Orijentacija ravnine i prostora


Opisana konstrukcija Kartezijeva sustava nije potpuno precizna. Krenuvši od tri međusobno okomite osi, u mogućnosti smo odabrali poredak jediničnih vektora na njima na dva bitno različita načina.

Slično se događa i u jednostavnoj situaciji u ravnini. Opišimo stoga najprije moguće orientacije ravnine.

Neka su zadane dvije međusobno okomite koordinatne osi. Prvi vektor \mathbf{i} odaberimo na bilo kojoj od koordinatnih osiju i s po volji odabranom orientacijom. Izbor vektora \mathbf{j} na drugoj osi odreduje tad orientaciju čitavoga sustava.

- Ako vektor \mathbf{j} odaberemo tako da se rotacijom vektora \mathbf{i} za 90° u pozitivnom smjeru on prevodi u vektor \mathbf{j} , tad kažemo da je sustav $(O; \mathbf{i}, \mathbf{j})$ pozitivno orijentiran ili desni sustav.
- Ako vektor \mathbf{i} moramo rotirati za 90° u negativnom smjeru da bi se poklopio s vektorom \mathbf{j} , tad kažemo da je sustav $(O; \mathbf{i}, \mathbf{j})$ negativno orijentiran ili lijevi sustav.


Pritom po dogovoru smatramo pozitivnom rotacijom onu kod koje je smjer okretanja suprotan onome kod kazaljki sata.



Sl. 1.13. Od dva sustava na slici jedan je pozitivno, drugi negativno orijentiran.

Kako će izgledati orijentacija u prostoru? Prvi vektor \mathbf{i} odaberimo na bilo kojoj od koordinatnih osiju, drugi vektor \mathbf{j} također. Sustav $(O; \mathbf{i}, \mathbf{j})$ tako dobiven u prostoru nema nikakve orijentacije, nju će odrediti tek izbor trećeg vektora.

Za izbor trećeg vektora \mathbf{k} na trećoj osi ostaju dvije bitno različite mogućnosti. Možemo odabrati jedan od dva međusobno suprotnih smjerova. Dvije različite mogućnosti izbora vode nas do dva međusobno različito orijentirana sustava (sl. 1.14).




Sl. 1.14. Dvije su mogućnosti za izbor pravokutnih koordinatnih sustava. Sustavi na slici suprotno su orijentirani. Sustav nacrtan desno naš je standardni koordinatni sustav koji nazivamo desni sustav. Sustav lijevo je njegova zrcalna slika, on predstavlja lijevi sustav.

Da bismo ih razlikovali, nazivamo ih imenima **desni** i **lijevi** koordinatni sustav. Desnim nazivamo onaj kod kojeg vektor \mathbf{i} gleda u smjeru srednjaka, vektor \mathbf{j} u smjeru palca, a vektor \mathbf{k} u smjeru kačiprsta *desne* ruke. Alternativno, desni sustav je onaj kod kojeg je ravnina $(O; \mathbf{i}, \mathbf{j})$ gledana iz vrha trećeg vektora \mathbf{k} pozitivno orijentirana.

Ta su dva sustava (matematički) potpuno ravnopravna. Međutim, uobičajeno je da se sve formule i razmatranja vrše samo u jednom sustavu. Pritom se dogovorno odabire **desni** sustav.

1.3. Skalarni umnožak

Kut među vektorima. Smatrat ćemo da je pojam kuta među vektorima jasan: to je manji (po apsolutnom iznosu) od dvaju kutova koji zatvaraju zadana dva vektora (translatirana u zajednički početak). Označavat ćemo ga sa $\varphi = \measuredangle(\mathbf{a}, \mathbf{b})$. Prema tomu, kut može poprimiti vrijednost $0 \leq \varphi \leq \pi$.



Sl. 1.15. Kut među dvama vektorima

Skalarni umnožak

Neka su \mathbf{a} , \mathbf{b} zadani vektori i $\varphi = \measuredangle(\mathbf{a}, \mathbf{b})$. **Skalarni umnožak (produkt)** vektora \mathbf{a} i \mathbf{b} definira se na način

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} := |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \varphi. \quad (3)$$

Time je definirano preslikavanje \cdot s produkta $V \times V$ u polje realnih brojeva (skalara) – skalarni umnožak vektora je realni broj. Odatle i ime ovom umnošku.

Ako je jedan od vektora \mathbf{a} ili \mathbf{b} jednak $\mathbf{0}$, tad je njihov skalarni umnožak po definiciji jednak nuli. Ta činjenica, strogo govoreći, ne slijedi iz (3), jer u tom slučaju kut φ među vektorima nije definiran.

Definicija (3) ima za posljedicu i formula

$$|\mathbf{a}|^2 = \mathbf{a} \cdot \mathbf{a}. \quad (4)$$

Također, za okomite će vektore biti $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$, jer je $\cos \pi/2 = 0$. Obratno, ako je $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$, tad možemo zaključiti da je barem jedan od vektora \mathbf{a} ili \mathbf{b} jednak nuli, ili pak kut među njima iznosi $\varphi = \pi/2$, tj. vektori su okomiti.

Projekcija vektora na vektor. Neka su zadani vektori $\mathbf{a} = \overrightarrow{OA}$ i $\mathbf{b} = \overrightarrow{OB}$. Projicirajmo ortogonalno točku B' na pravac OA i označimo projekciju sa B' . Vektor $\overrightarrow{OB'}$ naziva se (vektorska) projekcija vektora \mathbf{b} na vektor \mathbf{a} i označava sa \mathbf{b}_a (sl. 1.16). Očevidno je


$$\mathbf{b}_a = |\mathbf{b}| \cos \varphi \hat{\mathbf{a}}.$$

Budući da je $\mathbf{a} \cdot \hat{\mathbf{a}} = |\mathbf{a}|$, skalarni umnožak možemo napisati na način

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b}_a \cdot \mathbf{a}$$

i slično, zamijenimo li uloge vektora \mathbf{a} i \mathbf{b} ,

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a}_b \cdot \mathbf{b}.$$



Sl. 1.16. Projekcija vektora na vektor

Skalarnu veličinu $|\mathbf{b}| \cos \varphi$ nazivamo **skalarna projekcija vektora \mathbf{b} na vektor \mathbf{a}** i označavamo sa $\pi_{\mathbf{a}}(\mathbf{b})$. Prema tome, skalarni produkt možemo napisati i na način

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| \pi_{\mathbf{a}}(\mathbf{b}) = \pi_{\mathbf{b}}(\mathbf{a}) |\mathbf{b}|.$$

Navedimo sad ponašanje nove operacije \cdot prema već prije definiranim: zbrajanju vektora i množenju vektora skalarom.

Svojstva skalarnog umnoška

Skalarni umnožak ima sljedeća svojstva:

- | | | |
|---------|--|-------------------|
| (S_1) | $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} \geq 0, \quad \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = 0 \iff \mathbf{a} = \mathbf{0}$ | (pozitivnost) |
| (S_2) | $\lambda(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) = (\lambda \mathbf{a}) \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot (\lambda \mathbf{b})$ | (homogenost) |
| (S_3) | $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$ | (komutativnost) |
| (S_4) | $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}$ | (distributivnost) |


Ova svojstva omogućavaju nam da izraze sa skalarnim produktom ‘sređujemo’ na ‘prirodan’ način:

$$\begin{aligned} (2\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (3\mathbf{a} - 2\mathbf{b}) &= (2\mathbf{a}) \cdot (3\mathbf{a}) + \mathbf{b} \cdot (3\mathbf{a}) - (2\mathbf{a}) \cdot (2\mathbf{b}) + \mathbf{b} \cdot (-2\mathbf{b}) \\ &= 6\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} + 3\mathbf{b} \cdot \mathbf{a} - 4\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} - 2\mathbf{b} \cdot \mathbf{b} \\ &= 6\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} - \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} - 2\mathbf{b} \cdot \mathbf{b}. \end{aligned}$$

(Neki su koraci ubrzani!)

Svojstva $(S_1) - (S_3)$ slijede po definiciji. Za dokaz svojstva (S_4) pogledajmo sl. 1.17 i iskoristimo svojstva vektorske projekcije:

$$\begin{aligned} \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) &= |\mathbf{a}| \pi_{\mathbf{a}}(\mathbf{b} + \mathbf{c}) = |\mathbf{a}| (\pi_{\mathbf{a}}\mathbf{b} + \pi_{\mathbf{a}}\mathbf{c}) \\ &= |\mathbf{a}| \pi_{\mathbf{a}}\mathbf{b} + |\mathbf{a}| \pi_{\mathbf{a}}\mathbf{c} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}. \end{aligned}$$




Sl. 1.17. Distributivnost skalarnog umnoška

Primjer 8. Izvedi vektorskim računom kosinusov poučak.

Rješenje. Orientirajmo vektore stranica u trokutu kao na sl. 1.18. Tada je $\mathbf{c} = \mathbf{a} - \mathbf{b}$ i zato

$$\begin{aligned} |\mathbf{c}|^2 &= \mathbf{c} \cdot \mathbf{c} = (\mathbf{a} - \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b}) \\ &= |\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2 - 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \\ &= |\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2 - 2|\mathbf{a}||\mathbf{b}| \cos \gamma. \end{aligned}$$




Sl. 1.18.

Primjer 9. Dokaži da su dijagonale romba međusobno okomite.

Rješenje. Označimo vektore stranica i dijagonala romba kao na sl. 1.19. Vrijedi $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}|$ i $\mathbf{e} = \mathbf{a} + \mathbf{b}$, $\mathbf{f} = \mathbf{b} - \mathbf{a}$. Zato je

$$\begin{aligned} \mathbf{e} \cdot \mathbf{f} &= (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{b} - \mathbf{a}) \\ &= \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} - \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{b} - \mathbf{b} \cdot \mathbf{a} \\ &= -|\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2 = 0 \end{aligned}$$

i stoga $\mathbf{e} \perp \mathbf{f}$.



Sl. 1.19.

Skalarni umnožak u koordinatnom sustavu

Neka je $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ kanonska baza prostora V^3 . Čine je međusobno okomiti vektori jedinice duljine, pa za njihove skalarne umnoške vrijedi

$$\begin{array}{lll} \mathbf{i} \cdot \mathbf{i} = 1, & \mathbf{j} \cdot \mathbf{j} = 1, & \mathbf{k} \cdot \mathbf{k} = 1, \\ \mathbf{i} \cdot \mathbf{j} = 0, & \mathbf{j} \cdot \mathbf{k} = 0, & \mathbf{k} \cdot \mathbf{i} = 0. \end{array}$$

Zgodno je prikazati ove umnoške u sljedećoj tablici množenja

.	\mathbf{i}	\mathbf{j}	\mathbf{k}
\mathbf{i}	1	0	0
\mathbf{j}	0	1	0
\mathbf{k}	0	0	1

Svaki se vektor može na jednoznačan način prikazati preko vektora baze. Zato, ako je

$$\mathbf{a} = a_x \mathbf{i} + a_y \mathbf{j} + a_z \mathbf{k},$$

$$\mathbf{b} = b_x \mathbf{i} + b_y \mathbf{j} + b_z \mathbf{k},$$

tad za njihov skalarni umnožak dobivamo (koristeći svojstva skalarnoga produkta i gore napisanu tablicu)

$$\begin{aligned} \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} &= (a_x \mathbf{i} + a_y \mathbf{j} + a_z \mathbf{k}) \cdot (b_x \mathbf{i} + b_y \mathbf{j} + b_z \mathbf{k}) \\ &= a_x b_x \mathbf{i} \cdot \mathbf{i} + a_x b_y \mathbf{i} \cdot \mathbf{j} + a_x b_z \mathbf{i} \cdot \mathbf{k} \\ &\quad + a_y b_x \mathbf{j} \cdot \mathbf{i} + a_y b_y \mathbf{j} \cdot \mathbf{j} + a_y b_z \mathbf{j} \cdot \mathbf{k} \\ &\quad + a_z b_x \mathbf{k} \cdot \mathbf{i} + a_z b_y \mathbf{k} \cdot \mathbf{j} + a_z b_z \mathbf{k} \cdot \mathbf{k} \\ &= a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z. \end{aligned}$$

Računanje skalarног umnoška

Skalarni umnožak dvaju vektora

$$\mathbf{a} = a_x \mathbf{i} + a_y \mathbf{j} + a_z \mathbf{k}, \quad \mathbf{b} = b_x \mathbf{i} + b_y \mathbf{j} + b_z \mathbf{k}$$

računa se formulom

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z. \quad (5)$$

Primijetimo da je ovaj izraz usklađen s umnoшkom vektor-retka i vektor-stupca; ako je

$$\mathbf{a} \mapsto \begin{bmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} \mapsto \begin{bmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{bmatrix}$$

tad je skalarni umnožak vektora jednak umnošku

$$\begin{bmatrix} a_x & a_y & a_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{bmatrix}.$$

Ako poistovjetimo vektor prostora V^3 s njemu pridruženim vektor-stupcem u \mathbb{R}^3 , tad skalarni produkt $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ možemo pisati i na način $\mathbf{a}^\top \mathbf{b}$. Taj je zapis čest, pogotovo u tehničkoj literaturi.

Duljina vektora. Skalarni produkt vektora sa samim sobom daje kvadrat duljine vektora. Zato je

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}.$$

Kut između vektora. Ako su vektori zadani svojim komponentama, tad smo u mogućnosti izračunati skalarni produkt direktno i s pomoću njega kut između dvaju vektora:

$$\cos \varphi = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}| |\mathbf{b}|} = \frac{a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}}.$$

Primjer 10. Zadani su vektori $\mathbf{a} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$, $\mathbf{b} = \mathbf{i} - \mathbf{j} + 4\mathbf{k}$. Odredimo \mathbf{a}_b projekciju vektora \mathbf{a} u smjeru vektora \mathbf{b} .

Rješenje. Vrijedi $\mathbf{a}_b = (\mathbf{a} \cdot \hat{\mathbf{b}}) \hat{\mathbf{b}} = \frac{1}{|\mathbf{b}|^2} (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) \mathbf{b}$. $|\mathbf{b}|^2 = 1 + 1 + 16 = 18$ i $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 1 - 1 + 8 = 8$ pa je $\mathbf{a}_b = \frac{8}{18} (\mathbf{i} - \mathbf{j} + 4\mathbf{k}) = \frac{4}{9} \mathbf{i} - \frac{4}{9} \mathbf{j} + \frac{16}{9} \mathbf{k}$.

Primjer 11. Odredimo vektor \mathbf{b} koji je kolinearan s vektorom $\mathbf{a} = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ i zadovoljava uvjet $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = -18$.

Rješenje. Vektor \mathbf{b} moramo potražiti u obliku $\mathbf{b} = \lambda \mathbf{a}$. Mora biti $-18 = \lambda \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = \lambda(4 + 1 + 4) = 9\lambda$ pa slijedi $\lambda = -2$. Dakle, $\mathbf{b} = -4\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 4\mathbf{k}$.

1.4. Vektorski umnožak

Vektorski umnožak

Vektorski (ili vanjski) umnožak (produkt) vektora \mathbf{a} i \mathbf{b} je vektor $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$: sa sljedećim svojstvima:

$$(E_1) \quad |\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| |\sin \varphi|.$$

(E₂) $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ je okomit na vektor \mathbf{a} i na \mathbf{b} .


(E₃) Trojka ($\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{a} \times \mathbf{b}$) čini desni sustav.

Ako je jedan od vektora nul-vektor, vektorski je umnožak po definiciji i sam jednak nul-vektoru. To je u skladu sa svojstvom (E₁).

Ako su vektori \mathbf{a} i \mathbf{b} kolinearni, tad je, po uvjetu E₁ njihov vektorski produkt jednak $\mathbf{0}$ (nul-vektoru). (Preostala dva uvjeta više nisu bitna.)

Obratno, ako je $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0}$, tad možemo zaključiti, ponovno po istome uvjetu, da vektori \mathbf{a} i \mathbf{b} moraju biti kolinearni, ili je pak jedan od njih jednak nul-vektoru.

Sl. 1.20. Trojka $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{a} \times \mathbf{b}$ čini desni sustav.



Geometrijska interpretacija. Apsolutna vrijednost vektorskog produkta $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ jednaka je površini paralelograma što ga zatvaraju ta dva vektora. Ta se činjenica može iskoristiti u elementarnoj geometriji.

Na osnovu same definicije moguće je dokazati sljedeća temeljna svojstva vektorskoga umnoška:

Svojstva vektorskog umnoška

Teorem 2. Vektorski umnožak ima svojstva

- 1) $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}$, (antikomutativnost)
- 2) $(\lambda \mathbf{a}) \times \mathbf{b} = \lambda(\mathbf{a} \times \mathbf{b})$, (homogenost)
- 3) $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = \mathbf{a} \times \mathbf{c} + \mathbf{b} \times \mathbf{c}$. (distributivnost)

Svojstvo 1) posljedica je zahtjeva da trojka ($\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{a} \times \mathbf{b}$) čini desni sustav. Svojstvo 2) lagano se provjerava, promatrajući posebno pozitivne i posebno negativne vrijednosti za λ . Svojstvo 3) je netrivijalno i bazira se na geometrijskoj interpretaciji vektorskoga produkta i svojstvu distributivnosti za vektorskiju projekciju. Mi se nećemo sad upuštati

u detalje dokaza već ćemo ih navesti u dodatku ovome poglavlju. Ova su nam pak svojstva nužna da odredimo prikaz vektorskoga umnoška u Kartezijevu pravokutnom sustavu.

Primjer 12. Neka su \mathbf{m} i \mathbf{n} jedinični vektori koji zatvaraju kut od 45° . Odredimo površinu paralelograma s dijagonalama $\mathbf{e} = 2\mathbf{m} - \mathbf{n}$, $\mathbf{f} = 4\mathbf{m} - 5\mathbf{n}$.

Rješenje. Površina paralelograma iznosi

$$P = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \sin \measuredangle(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = |\mathbf{a} \times \mathbf{b}|.$$

Budući da je $\mathbf{e} = \mathbf{a} + \mathbf{b}$, $\mathbf{f} = -\mathbf{a} + \mathbf{b}$, vrijedi $\mathbf{a} = \frac{1}{2}(\mathbf{e} - \mathbf{f})$, $\mathbf{b} = \frac{1}{2}(\mathbf{e} + \mathbf{f})$.

$$\begin{aligned}\mathbf{a} \times \mathbf{b} &= \frac{1}{4}(\mathbf{e} - \mathbf{f}) \times (\mathbf{e} + \mathbf{f}) = \frac{1}{4}(\mathbf{e} \times \mathbf{e} - \mathbf{f} \times \mathbf{e} + \mathbf{e} \times \mathbf{f} - \mathbf{f} \times \mathbf{f}) \\ &= \frac{1}{2}\mathbf{e} \times \mathbf{f} = \frac{1}{2}(2\mathbf{m} - \mathbf{n}) \times (4\mathbf{m} - 5\mathbf{n}) \\ &= \frac{1}{2}(8\mathbf{m} \times \mathbf{m} - 10\mathbf{m} \times \mathbf{n} - 4\mathbf{n} \times \mathbf{m} + 5\mathbf{n} \times \mathbf{n}) \\ &= \frac{1}{2}(10\mathbf{n} \times \mathbf{m} - 4\mathbf{n} \times \mathbf{m}) = 3\mathbf{n} \times \mathbf{m}.\end{aligned}$$

$$\text{Odavde } P = 3|\mathbf{n} \times \mathbf{m}| = 3 \sin 45^\circ = \frac{3\sqrt{2}}{2}.$$

Vektorski umnožak u koordinatnom sustavu

Na temelju definicije u mogućnosti smo napraviti tablicu množenja za vektorski umnožak. Vrijedi (uvjerite se u to!)

$$\begin{array}{lll}\mathbf{i} \times \mathbf{i} = \mathbf{0}, & \mathbf{j} \times \mathbf{j} = \mathbf{0}, & \mathbf{k} \times \mathbf{k} = \mathbf{0}, \\ \mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k}, & \mathbf{j} \times \mathbf{k} = \mathbf{i}, & \mathbf{k} \times \mathbf{i} = \mathbf{j}, \\ \mathbf{j} \times \mathbf{i} = -\mathbf{k}, & \mathbf{k} \times \mathbf{j} = -\mathbf{i}, & \mathbf{i} \times \mathbf{k} = -\mathbf{j}.\end{array}$$

Zapišimo te vrijednosti u tablicu množenja vektorskog umnoška:

\times	\mathbf{i}	\mathbf{j}	\mathbf{k}
\mathbf{i}	0	\mathbf{k}	$-\mathbf{j}$
\mathbf{j}	$-\mathbf{k}$	0	\mathbf{i}
\mathbf{k}	\mathbf{j}	$-\mathbf{i}$	0

Izračunajmo sad kako se računa vektorski umnožak dvaju vektora zadanih svojim komponentama u kanonskoj bazi, koristeći svojstva navedena u teoremu.

$$\begin{aligned}\mathbf{a} \times \mathbf{b} &= (a_x \mathbf{i} + a_y \mathbf{j} + a_z \mathbf{k}) \times (b_x \mathbf{i} + b_y \mathbf{j} + b_z \mathbf{k}) \\ &= a_x b_x \mathbf{i} \times \mathbf{i} + a_x b_y \mathbf{i} \times \mathbf{j} + a_x b_z \mathbf{i} \times \mathbf{k} \\ &\quad + a_y b_x \mathbf{j} \times \mathbf{i} + a_y b_y \mathbf{j} \times \mathbf{j} + a_y b_z \mathbf{j} \times \mathbf{k} \\ &\quad + a_z b_x \mathbf{k} \times \mathbf{i} + a_z b_y \mathbf{k} \times \mathbf{j} + a_z b_z \mathbf{k} \times \mathbf{k} \\ &= (a_y b_z - a_z b_y) \mathbf{i} + (a_z b_x - a_x b_z) \mathbf{j} + (a_x b_y - a_y b_x) \mathbf{k}.\end{aligned}$$

U ovoj formuli možemo uočiti cikličko mijenjanje indeksa. No, da bismo je zapamtili, primjetit ćemo da ovaj izraz nalikuje rastavu determinante trećega reda. Zaista, nastavljajući gornju formulu možemo je napisati u sljedećem obliku.

Računanje vektorskog umnoška

Vektorski umnožak dvaju vektora

$$\mathbf{a} = a_x \mathbf{i} + a_y \mathbf{j} + a_z \mathbf{k}, \quad \mathbf{b} = b_x \mathbf{i} + b_y \mathbf{j} + b_z \mathbf{k}$$

računa se formulom

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} a_x & a_z \\ b_x & b_z \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix} \mathbf{k} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}. \quad (6)$$

Pritom nas ne smije smetati što se u prvoj retku ove determinante nalaze *vektori*. S njima možemo postupati i determinantu računati onako kako smo dosad naučili, stoga što su definirane sve operacije zbrajanja i množenja koje pritom mogu nastupiti.

Primjer 13. Vektorski umnožak vektora $\mathbf{a} = 2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + \mathbf{k}$ i $\mathbf{b} = -\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$ iznosi

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & -3 & 1 \\ -1 & 1 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} \mathbf{k} = 5\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - \mathbf{k}.$$

Primjer 14. Odredimo površinu P i visinu v_B spuštenu iz vrha B u trokutu ABC s vrhovima $A(1, -2, 8)$, $B(0, 0, 4)$, $C(6, 2, 0)$.

Rješenje. Vrijedi

$$\overrightarrow{AB} = (0 - 1)\mathbf{i} + (0 + 2)\mathbf{j} + (4 - 8)\mathbf{k} = -\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 4\mathbf{k},$$

$$\overrightarrow{AC} = (6 - 1)\mathbf{i} + (2 + 2)\mathbf{j} + (0 - 8)\mathbf{k} = 5\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - 8\mathbf{k}.$$

Zato je

$$P = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = \frac{1}{2} \left| \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -1 & 2 & -4 \\ 5 & 4 & -8 \end{vmatrix} \right| = \frac{1}{2} | -28\mathbf{j} - 14\mathbf{k} | = 7|2\mathbf{j} + \mathbf{k}| = 7\sqrt{5}.$$

Još trebamo $v_B = \frac{2P}{|\overrightarrow{AC}|}$. $|\overrightarrow{AC}| = \sqrt{5^2 + 4^2 + 8^2} = \sqrt{105}$ pa je $v_B = \frac{2}{3}\sqrt{21}$.



Formula (6) u nekim se udžbenicima može pronaći kao *definicija* vektorskoga umnoška. Razlog tomu je što se vektorski umnožak zaista najčešće računa za vektore zadane u komponentnom prikazu. Nadalje, krenuvši od upravo te formule lako je dokazati ključna svojstva iskazana teoremom 2. Loša strana ovoga pristupa je u tome što

tek treba uspostaviti vezu između ove *algebarske* definicije i geometrijskih svojstava vektorskoga produkta s pomoću kojih smo ga mi definirali.

Alternativni dokaz teorema 2. Prvo svojstvo je posljedica toga što determinanta pri zamjeni dvaju redaka mijenja predznak:

$$\mathbf{b} \times \mathbf{a} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ b_x & b_y & b_z \\ a_x & a_y & a_z \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = -\mathbf{a} \times \mathbf{b}.$$

Drugo svojstvo slijedi iz načina na koji se determinanta množi s brojem:

$$(\lambda \mathbf{a}) \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \lambda a_x & \lambda a_y & \lambda a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = \lambda (\mathbf{a} \times \mathbf{b}).$$

Na sličan se način, koristeći rastav determinante na zbroj dviju, dokazuje i treće svojstvo¹.

1.5. Mješoviti umnožak

Mješovitim umnoškom triju vektora \mathbf{a} , \mathbf{b} i \mathbf{c} nazivamo umnožak tipa $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}$. Taj je produkt skalarna veličina.

Odredimo formulu za mješoviti umnožak vektora zadanih u Kartezijevim komponentama. Neka je

$$\mathbf{a} = a_x \mathbf{i} + a_y \mathbf{j} + a_z \mathbf{k},$$

$$\mathbf{b} = b_x \mathbf{i} + b_y \mathbf{j} + b_z \mathbf{k},$$

$$\mathbf{c} = c_x \mathbf{i} + c_y \mathbf{j} + c_z \mathbf{k}.$$

Korištenjem formule za vektorski i skalarni umnožak dobivamo

$$\begin{aligned} (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} &= [(a_y b_z - a_z b_y) \mathbf{i} + (a_z b_x - a_x b_z) \mathbf{j} + (a_x b_y - a_y b_x) \mathbf{k}] \cdot [c_x \mathbf{i} + c_y \mathbf{j} + c_z \mathbf{k}] \\ &= (a_y b_z - a_z b_y) c_x + (a_z b_x - a_x b_z) c_y + (a_x b_y - a_y b_x) c_z \\ &= \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}. \end{aligned} \tag{7}$$

Mješoviti umnožak jednak je determinanti kojoj su redci komponente pojedinih vektora.



Iskoristit ćemo ovaj prikaz i svojstva determinata da izvedemo neobično svojstvo mješovitog umnoška. Pogledamo li dobivenu formulu unatrag, vidimo da je mješoviti umnožak *u poretku* $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}$ dobiven tako da je determinanta razvijena po trećem

¹ Čitatelj mora vidjeti kako, strogo govoreći, teorem 2 ovim nije dokazan. Naime, algebarski prikaz vektorskoga produkta je izведен korištenjem istih svojstava koja se naknadno dokazuju s pomoću tog prikaza.

retku i potom rezultat interpretiran kao skalarni umnožak. Međutim, za determinante vrijedi sljedeće:

$$\begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} c_x & c_y & c_z \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \\ a_x & a_y & a_z \end{vmatrix}.$$

To znači da će za mješoviti umnožak vrijediti:

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) \cdot \mathbf{b} = (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \cdot \mathbf{a}.$$

Ove formule iskazujemo riječima:

- *Mješoviti umnožak ne mijenja vrijednost cikličkom zamjenom vektora.*

Nadalje, ako zamijenimo prva dva vektora, tad zbog antikomutativnosti vektorskoga umnoška (ili zamjene dvaju redaka u determinanti!) slijedi

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = -(\mathbf{b} \times \mathbf{a}) \cdot \mathbf{c}$$

i slično za preostale dvije cikličke permutacije desne strane.

Ova svojstva upućuju da je opravdano za mješoviti produkt uvesti oznaku $[\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}]$ koja sugerira kako je svejedno na koja ćemo mjesta staviti operacije skalarnoga i vektorskoga množenja:

$$[\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}] = (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}).$$

Tako vrijedi

$$[\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}] = [\mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{a}] = [\mathbf{c}, \mathbf{a}, \mathbf{b}] = -[\mathbf{b}, \mathbf{a}, \mathbf{c}] = -[\mathbf{a}, \mathbf{c}, \mathbf{b}] = -[\mathbf{c}, \mathbf{b}, \mathbf{a}].$$


Geometrijska interpretacija. Naka su $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ tri zadana nekomplanarna vektora. Napišimo njihov mješoviti umnožak u obliku

$$[\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}] = (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}.$$

Apsolutna vrijednost tog umnoška je jednaka

$$|[\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}]| = |\mathbf{a} \times \mathbf{b}| \cdot |\mathbf{c}| \cdot \cos \psi$$

pri čemu je ψ kut koji zatvaraju vektori \mathbf{c} i $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ (sl. 1.21).



Sl. 1.21. Mješoviti produkt jednak je obujmu paralelepipađa razapetog vektorima $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$. Zato je i vrijednost determinante trećega reda jednaka obujmu paralelepipađa koji razapinju vektor-redci (ili vektor-stupci!).

Apsolutna vrijednost vektorskoga produkta $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|$ jednaka je površini paralelograma koji razapinju ta dva vektora. Umnožak $|\mathbf{c}| \cos \psi$ odgovara projekciji vektora \mathbf{c} na os okomitu na taj paralelogram: to je upravo visina paralelepipađa koji razapinju vektori $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$. Zato je apsolutna vrijednost toga skalarnoga produkta jednaka obujmu paralelepipađa.

Mješoviti produkt, determinanta i orientacija baze. Primijetimo da je mješoviti produkt pozitivan ako vektor \mathbf{c} zatvara šiljasti kut s vektorm $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$. No, to upravo znači da trojka $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ čini desni sustav. Ovaj kriterij nam može poslužiti i za strogu definiciju orientacije baze u vektorskom prostoru V^3 : baza $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ je **pozitivno orijentirana** (tj. trojka $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ čini desni sustav) ako je vrijednost

$$[\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}] = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}$$

pozitivna. Ako je ta determinanta negativna, odgovarajuća baza je **negativno orijentirana ili lijeva**.

1.6. Rastav vektora po bazi

Neka je $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ bilo koja baza u prostoru V^3 . Da bismo odredili komponente vektora \mathbf{d} u toj bazi, možemo postupiti na sljedeći način. Napišimo jednakost

$$\mathbf{d} = \alpha \mathbf{a} + \beta \mathbf{b} + \gamma \mathbf{c}.$$

Da bismo odredili tražene komponente α, β, γ , sve ćemo vektore prikazati u kanonskoj bazi $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$. Nakon toga ćemo izjednačiti odgovarajuće koordinate:

$$d_x \mathbf{i} + d_y \mathbf{j} + d_z \mathbf{k} = \alpha(a_x \mathbf{i} + a_y \mathbf{j} + a_z \mathbf{k}) + \beta(b_x \mathbf{i} + b_y \mathbf{j} + b_z \mathbf{k}) + \gamma(c_x \mathbf{i} + c_y \mathbf{j} + c_z \mathbf{k})$$

Odavde dobivamo sljedeći sustav

$$\begin{aligned} a_x \alpha + b_x \beta + c_x \gamma &= d_x \\ a_y \alpha + b_y \beta + c_y \gamma &= d_y \\ a_z \alpha + b_z \beta + c_z \gamma &= d_z \end{aligned}$$

Ovaj sustav uvijek ima jednoznačno rješenje jer su redci matrice linearne nezavisni vektori $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ te je ona regularna. Odavde dobivamo, Cramerovim pravilom

$$\alpha = \frac{\begin{vmatrix} d_x & b_x & c_x \\ d_y & b_y & c_y \\ d_z & b_z & c_z \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_x & b_x & c_x \\ a_y & b_y & c_y \\ a_z & b_z & c_z \end{vmatrix}} = \frac{[\mathbf{d}, \mathbf{b}, \mathbf{c}]}{[\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}]}$$

jer se determinanta ne mijenja transponiranjem. Slično dobivamo

$$\beta = \frac{[\mathbf{a}, \mathbf{d}, \mathbf{c}]}{[\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}]}, \quad \gamma = \frac{[\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{d}]}{[\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}]}.$$

Na taj način možemo napisati sljedeću formulu za rastav nekog vektora \mathbf{d} po vektorima baze $(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})$:

$$\mathbf{d} = \frac{[\mathbf{d}, \mathbf{b}, \mathbf{c}]}{[\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}]} \mathbf{a} + \frac{[\mathbf{a}, \mathbf{d}, \mathbf{c}]}{[\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}]} \mathbf{b} + \frac{[\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{d}]}{[\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}]} \mathbf{c}.$$

Koordinate vektora u ortogonalnoj bazi

Kažemo da je baza $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ **ortogonalna** ako su svaka dva vektora u njoj međusobno okomita. Tad je vektor $\mathbf{b} \times \mathbf{c}$ proporcionalan vektoru \mathbf{a} i za prvu komponentu u gornjem rastavu vrijedi

$$\frac{[\mathbf{d}, \mathbf{b}, \mathbf{c}]}{[\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}]} = \frac{\mathbf{d} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})}{\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})} = \frac{\mathbf{d} \cdot \lambda \mathbf{a}}{\mathbf{a} \cdot \lambda \mathbf{a}} = \frac{\mathbf{d} \cdot \mathbf{a}}{|\mathbf{a}|^2}$$

Na taj način dobivamo sljedeću važnu formulu

Prikaz vektora u ortogonalnoj bazi

Ako vektori $(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})$ čine ortogonalnu bazu u V^3 , onda se svaki vektor \mathbf{d} prostora V^3 može prikazati u obliku

$$\mathbf{d} = \frac{\mathbf{d} \cdot \mathbf{a}}{|\mathbf{a}|^2} \mathbf{a} + \frac{\mathbf{d} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{b}|^2} \mathbf{b} + \frac{\mathbf{d} \cdot \mathbf{c}}{|\mathbf{c}|^2} \mathbf{c} \quad (8)$$

Postoji mnogo prirodniji način za izvođenje ove formule. Taj ćemo način moći poopćiti s trodimenzionalnoga i u višedimenzionalni prostor, gdje mješoviti produkt gubi svoj smisao.

Ako su vektori $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ međusobno okomiti, tad iz relacije

$$\mathbf{d} = \alpha \mathbf{a} + \beta \mathbf{b} + \gamma \mathbf{c}$$

skalarnim množenjem s vektorom \mathbf{a} dobivamo

$$\mathbf{d} \cdot \mathbf{a} = \alpha \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} + \beta \mathbf{b} \cdot \mathbf{a} + \gamma \mathbf{c} \cdot \mathbf{a}.$$

Zbog ortogonalnosti je $\mathbf{b} \cdot \mathbf{a} = 0$ i $\mathbf{c} \cdot \mathbf{a} = 0$. Zato

$$\mathbf{d} \cdot \mathbf{a} = \alpha \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} \implies \alpha = \frac{\mathbf{d} \cdot \mathbf{a}}{|\mathbf{a}|^2}.$$

Slično se određuju preostale dvije komponente.

Koordinate vektora u ortonormiranoj bazi. Za bazu kažemo da je **ortonormirana** ako je ortogonalna i ako su svi vektori u njoj jedinične duljine. Primjer takve baze je kanonska baza $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$. Rastav vektora po ortonormiranoj bazi iznimno je jednostavan. Pogledajmo kako izgleda taj rastav u kanonskoj bazi, u svakoj drugoj izvod je analogan. Vektor \mathbf{a} zapisujemo u bazi $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ na način

$$\mathbf{a} = a_x \mathbf{i} + a_y \mathbf{j} + a_z \mathbf{k}. \quad (9)$$

Pomnožimo relaciju (9) skalarno sa \mathbf{i} :

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{i} = a_x \mathbf{i} \cdot \mathbf{i} + a_y \mathbf{j} \cdot \mathbf{i} + a_z \mathbf{k} \cdot \mathbf{i}.$$

Vrijedi $\mathbf{i} \cdot \mathbf{i} = 1$, $\mathbf{j} \cdot \mathbf{i} = 0$, $\mathbf{k} \cdot \mathbf{i} = 0$, pa odavde zaključujemo da vrijedi $a_x = \mathbf{a} \cdot \mathbf{i}$. Slično dobivamo i za druge komponente.

Prikaz vektora u ortonormiranoj bazi

Koordinate vektora $\mathbf{a} = a_x \mathbf{i} + a_y \mathbf{j} + a_z \mathbf{k}$ u ortonormiranoj bazi $(\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k})$ računaju se formulama

$$a_x = \mathbf{a} \cdot \mathbf{i}, \quad a_y = \mathbf{a} \cdot \mathbf{j}, \quad a_z = \mathbf{a} \cdot \mathbf{k}.$$

Prikaz vektora u takvoj bazi glasi:

$$\mathbf{a} = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{i}) \mathbf{i} + (\mathbf{a} \cdot \mathbf{j}) \mathbf{j} + (\mathbf{a} \cdot \mathbf{k}) \mathbf{k} \quad (10)$$

Neka su α, β, γ kutovi koje zatvara vektor \mathbf{a} s pozitivnim dijelovima koordinatnih osiju. Tako npr. vrijedi $a_x = \mathbf{a} \cdot \mathbf{i} = |\mathbf{a}| \cos \alpha$ te je

$$\mathbf{a} = |\mathbf{a}|(\cos \alpha \mathbf{i} + \cos \beta \mathbf{j} + \cos \gamma \mathbf{k}).$$

Specijalno, za jedinični vektor $\hat{\mathbf{a}}$ imamo

$$\hat{\mathbf{a}} = \cos \alpha \mathbf{i} + \cos \beta \mathbf{j} + \cos \gamma \mathbf{k}.$$

Kutovi α, β, γ nisu nezavisni, znajući dva možemo odrediti treći. Naime, računajući kvadrat norme gornjega vektora, dobivamo

$$1 = \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma. \quad (11)$$